

都道府県医師会・都市区医師会 御中

発行: 公益社団法人日本医師会

発行日: 2021年3月31日

## 日本医師会新型コロナワクチン速報【第6号】

新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報を速報いたします。必要とされているにもかかわらず不確定な情報については、確定され次第ご案内いたします。

## 【目次: 第6号】

1. 「コミナティ筋注」接種状況について
2. 副反応疑い報告の状況について

## 1. 「コミナティ筋注」接種状況について

- ・ 「コミナティ筋注」を用いた先行接種は2021年2月17日に始まりました。医療従事者優先接種は3月から各地で順次開始されています。2021年3月21日までに推定578,835回接種が行われました。

## 2. 副反応疑い報告の状況について

- ・ 2021年2月17日から2021年3月21日までに798例の副反応疑い報告がありました(医療機関から733例、ファイザー社から65例)。これらには発熱、頭痛、皮疹なども含まれます。[厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年3月26日開催) 資料1-1、資料1-2]。
- ・ アナフィラキシー疑いとして報告された181件のうち47件がアナフィラキシーであると医学的に評価されました(ブライトン分類1, 2, 3)。[厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年3月26日開催) 資料1-4]。
- ・ 先行接種者のうち健康観察の調査対象者約2万人の接種後の中間報告によれば、2回目接種では1回目と比べてやや強い疲労や頭痛、寒気など症状を自覚する人が増える傾向があります。多くの場合、症状は一両日中に軽快・回復します。[厚生労働省 副反応検討部会及び安全対策調査会合同会議(令和3年3月26日開催) 資料2]。

接種後の反応	1回目接種 (%) n=19,035	2回目接種 (%) n=3,933
発熱 (37.5%以上)	3.3%	35.6%
接種部位反応	92.9%	93.0%
発赤	13.9%	16.0%
疼痛	92.3%	91.9%
腫脹	12.5%	16.9%
硬結	10.6%	9.9%
熱感	12.8%	16.6%
全身症状	35.7%	73.7%
倦怠感	23.2%	67.3%
頭痛	21.2%	49.0%
鼻水	10.3%	13.0%

「コミナティ筋注」(ファイザー社)を接種した後(1回目と2回目)に報告された症状の頻度

問い合わせ窓口	健康医療第2課 k2@po.med.or.jp 薬務対策室 yakumu@po.med.or.jp
---------	--