

(法安 38) F

令和 3 年 6 月 2 日

都道府県医師会

都市区医師会

医療安全担当理事 殿

日本医師会常任理事

城守 国斗

(公 印 省 略)

## 【重要】

ジョイクル関節注 30mg による  
ショック、アナフィラキシーについて

関節機能改善剤であるジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム（販売名：ジョイクル関節注 30mg）において、2021 年 3 月 23 日の製造販売承認取得以降、5 月 28 日までの間に、本剤使用患者において重篤なショック、アナフィラキシーの症例が 10 例報告されています（推定使用患者約 5,500 人<sup>注</sup>）。

このうち 1 例は、因果関係は不明ですが、死亡に至った症例として報告されています。注) 推定使用患者数は承認から 2021 年 5 月 28 日まで

これを受けて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課より、同剤について、別添のとおり「使用上の注意」を改訂するとともに、安全性速報が配布された旨、本会宛て連絡がありました。

つきましては、下記の点に注意していただきますよう貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

## 記

1. 本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがあるので、投与に際しては、緊急時に十分な対応のできる準備をすること。
2. 本剤投与後少なくとも 30 分間は、医師の管理下で患者の状態を十分に観察すること。また、本剤投与後のショック、アナフィラキシーの発現は、投与直後に限らず、医療機関から帰宅後に発現している症例も報告されている点に留意すること。
3. 患者又は家族等に対して、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること、及びその徴候や症状について十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう指導すること。

※参考といたしまして、厚生労働省報道発表資料を添付いたします。

URL : [https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073061\\_00004.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073061_00004.html)

(別添2)

**重  
要**

# 安全性速報

2021年6月  
21-01号

## ジョイクル®関節注30mgによる ショック、アナフィラキシーについて

2021年3月23日の製造販売承認取得以降、5月28日までの間に、本剤使用患者において重篤なショック、アナフィラキシーの症例が10例報告されています(推定使用患者数: 約5,500人<sup>※</sup>)。

このうち1例は、因果関係は不明ですが、死亡に至った症例として報告されています。このため、本剤の「使用上の注意」の「警告」を新設し、「重要な基本的注意」及び「重大な副作用」を改訂することと致しました。

注) 推定使用患者数は承認から2021年5月28日まで

本剤の使用にあたっては、下記の事項に十分にご留意ください。

- 本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがあるので、投与に際しては、緊急時に十分な対応のできる準備をしてください。
- 本剤投与後少なくとも30分間は、医師の管理下で患者の状態を十分に観察してください。また、本剤投与後のショック、アナフィラキシーの発現は、投与直後に限らず、医療機関から帰宅後に発現している症例も報告されている点に留意してください。
- 患者又は家族等に対して、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること、及びその徴候や症状について十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう指導してください。

【お問い合わせ先】

販売元: 小野薬品工業株式会社 くすり相談室

(電話 0120-626-190 受付時間: 土日・祝日・会社休日を除く 9時~17時)

[ジョイクル治験時のアナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応の詳細]

症例 1	性別	報告者の用語	発現の	転帰	重症度	因果関係	その他の処置
	年齢(歳)	基本語	タイミング*	転帰日(日)	重篤性	治験薬に対してとられた処置	
	女性	Anaphylactic shock	初回投与後1日	回復	中等度	投与中止	併用薬 撲滅
	55	アナフィラキシーショック		発現後6日	重篤		
MedDRA/J Version 21.1 a: 発現日 - 投与開始日 + 1 b: 転帰日 - 発現日 + 1							
初回投与後日数	経過及び処置						
投与開始日	<p>10:31 治験薬を対象膝(右膝)に投与。治験薬投与前血圧 141/78 mmHg。治験薬投与後、会社へ向かう途中で右膝の腫れ、痛みあり。</p> <p>13:00 蕁麻疹発現。</p> <p>15:00 嘔気あり。</p> <p>16:23 被験者から治験協力者へ電話連絡あり、上記の症状があることを聴取したと報告を受け、すぐに来院するよう指示。</p> <p>18:20 治験実施医療機関に到着。到着時に全身発疹、冷感、気分不快、顔面蒼白、ふるえの症状あり。</p> <p>18:30 生理食塩液 100 mL + デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム点滴開始。右膝が腫れているため関節液を排液。血圧: 88/64 mmHg。</p> <p>19:00 点滴終了。血圧 99/72 mmHg。</p> <p>19:30 症状軽快のため、帰宅。プレドニゾン、ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩、ピラステンを5日分処方。治験薬投与後の事象であり、治験薬との関連が否定できない状況であるため、これ以上の治験継続は困難と判断した。また、対象膝関節液の一般細菌検査及び免疫学的検査、臨床検査を実施。</p>						
投与後4日	蕁麻疹の発現と消失を繰り返している、その他の症状はない。						
投与後6日	再診。治験薬投与開始日に処方の内服薬は飲み切り終了。本日から蕁麻疹の発現なし。全身状態良好。(転帰:回復)						
被験者背景: 女性、55歳、身長: 160.4 cm、体重: 60.8 kg 既往歴: なし、合併症: 背部痛、変形性関節症 併用薬(有害事象発現までに使用された薬剤): なし 他の有害事象: なし							

症例 2	性別	報告者の用語	発現の	転帰	重症度	因果関係	その他の処置
	年齢(歳)	基本語	タイミング*	転帰日(日)	重篤性	治験薬に対してとられた処置	
	女性	Anaphylaxis	初回投与後1日	回復	中等度	投与中止	併用薬
	52	アナフィラキシー反応		発現後8日	重篤		
MedDRA/J Version 21.1 a: 発現日 - 投与開始日 + 1 b: 転帰日 - 発現日 + 1							

初回投与後日数	経過及び処置						
投与開始日	<p>12:10 治験薬投与。治験薬投与前血圧: 129/85 mmHg。</p> <p>12:30頃 有害事象なく帰宅。</p> <p>14:30頃 被験者より電話連絡あり。投与部位(右膝)に腫脹、熱感あり。経過観察とした。</p> <p>15:00頃 そう痒感発現。</p> <p>15:30頃 再度電話連絡あり。全身発赤・そう痒感あり。再来院を指示。</p> <p>16:00頃 再来院。血圧: 108/74 mmHg、脈拍数: 94 拍/分、SpO<sub>2</sub>: 96%、呼吸数: 23 回/分。 全身に発疹・そう痒感・体動時の呼吸苦あり。併用薬はなく、治験薬によるアレルギー症状と判断し、治験中止とした。 メクロルフェニラミンマレイン酸塩 5 mg、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100 mg 点滴投与。 点滴終了後、症状軽快。血圧: 114/81 mmHg、脈拍数: 75 拍/分。 ベタメタゾン・メクロルフェニラミンマレイン酸塩を処方し、一旦帰宅</p> <p>20:18 呼吸苦・吐気・嘔吐・発疹にて治験実施医療機関へ救急搬送され、処置の後入院と判断。 到着時、体温: 36.2°C、脈拍数: 77 拍/分、血圧: 127/95 mmHg、SpO<sub>2</sub>: 98%、呼吸数: 28 回/分。 呼吸苦(-)、顔面・下腿膨隆疹(+)、そう痒感(-)、嘔吐(-)。 乳酸リンゲル液 500 mL、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 200 mg、メクロルフェニラミンマレイン酸塩 10 mg、塩酸メクロプラミド 10 mg を点滴投与。</p> <p>22:30 顔面・下腿膨隆疹(-)。乳酸リンゲル液 500 mL を点滴投与。</p>						
投与後2日	<p>両手・大腿部・下腿部・足底に軽度膨隆疹あり。前日から腹痛、下痢あり。</p> <p>メクロルフェニラミンマレイン酸塩 5 mg、乳酸リンゲル液 500 mL、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム 500 mg、アミノフィリン水和物 250 mg を点滴投与。体温: 37.5°C、脈拍数: 85 拍/分、血圧: 123/71 mmHg、呼吸数: 14 回/分。 発疹軽快。11:00 より外出。</p> <p>帰院後、20:30 頃に膨隆疹発現、そう痒感あり。 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100 mg、グリテリルチン酸-アンモニウム・グリシン・L-システイン 40 mL を点滴投与し膨隆疹軽快、そう痒感消失。</p>						
投与後3日	<p>膨隆疹発現、そう痒感軽度あり。</p> <p>メクロルフェニラミンマレイン酸塩 5 mg、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100 mg を点滴投与。 膨隆疹軽減傾向にて 8:30 より外出。</p>						

	20:15 帰院後、両頬紅潮あり。徐々に全身膨隆疹発現、そう痒感、疼痛軽度あり。 メクロルフェニラミンマレイン酸塩 5 mg、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100 mg を点滴投与後、軽快。
投与後 4 日	膨隆疹消失、そう痒感(-)、呼吸苦(-)、跛行(-)、腫脹(-)。発疹の頻度は下がっており、退院と判断。 念のため、メクロルフェニラミンマレイン酸塩 5 mg、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100 mg を点滴投与。ベタメタゾン・メクロルフェニラミンマレイン酸塩は、3錠/日から6錠/日に増量継続とし、引き続き経過観察とした。
投与後 8 日	治験中止時検査実施。 退院後は症状再発なく、ベタメタゾン・メクロルフェニラミンマレイン酸塩は、本日より服用を一旦中止とした。(転帰:回復)
被験者背景: 女性、52歳、身長: 160.5 cm、体重: 60.1 kg 既往歴: なし、合併症: 背部痛 併用薬(有害事象発現までに使用された薬剤): なし 他の有害事象: 下痢(症例報告書の記載名: diarrhea)(治験薬投与開始日)	

#### ◆ [ジョイクル市販後のアナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応の一覧]

No.	発現年度	年齢	性別	副作用 (PT)	転帰	最終投与から発症までの時間
1	2021	80歳	女	アナフィラキシーショック	死亡	不明(自宅にタクシーで帰り、自宅近くで)
2	2021	85歳	女	冷汗、蕁麻疹、腹部不快感、 血圧低下	不明	数分後
3	2021	不明	不明	アナフィラキシーショック	不明	不明
4	2021	不明	不明	アナフィラキシー反応	回復	投与直後
5	2021	不明	不明	アナフィラキシー反応	不明	不明(午前中に本剤投与し、午後 診療開始時に再来院)
6	2021	83歳	不明	アナフィラキシーショック	軽快	数分後
7	2021	81歳	女	全身のかゆみ(特に両腕のか ゆみ)、膨隆疹	不明	不明(1日後に再来院)
8	2021	75歳	女	アナフィラキシーショック	不明	投与後5~10分後
9	2021	70歳代	女	アナフィラキシーショック	不明	使用した直後
10	2021	不明	不明	アナフィラキシー、蕁麻疹	不明	不明

**使用上の注意の改訂内容**

薬生安指示による改訂

下線部: 改訂箇所

u003c/div>

改訂後	改訂前
<p>1. 警告</p> <p><u>本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがあるので、本剤は、緊急時に十分な対応のできる準備をした上で投与し、投与後も十分な観察を行うこと。〔8.1、11.1.1 参照〕</u></p>	<p>(新規)</p>
<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>8.1 <u>本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがあるので、投与に際しては、緊急処置を取れる準備をすること。投与中及び投与後は患者の状態を十分に観察すること。</u></p> <p><u>また、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること、及びその徴候や症状について患者又は家族等に十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう、患者等を指導すること。〔1、11.1.1 参照〕</u></p> <p>8.2~8.4 (略)</p>	<p>8. 重要な基本的注意</p> <p>(新規)</p> <p>8.1~8.3 (略)</p>
<p>11. 副作用</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1 <u>ショック、アナフィラキシー (0.4%) 〔1、8.1 参照〕</u></p>	<p>11. 副作用</p> <p>11.1 重大な副作用</p> <p>11.1.1 ショック、アナフィラキシー (0.4%)</p>

販売元

 **小野薬品工業株式会社**

製造販売元

 **生化学工業株式会社**




## 「ジョイクル®関節注30mg」を投与される 患者様とご家族の皆様へ

- 投与後数時間は、アナフィラキシーが起こる可能性があります。
- 投与直後から帰宅後にかけて、ご自身の状態をよく観察いただき、体調変化には十分ご注意ください。また、ご家族など周りの方は、帰宅後の患者さんの状態に注意してください。
- 下記のような症状があらわれた場合には、すぐに医療機関を受診してください。受診の際は、ジョイクル関節注を投与されたことを伝えてください。

### ◆皮膚症状

皮膚のかゆみ、  
じんま疹、  
紅斑・皮膚の  
発赤 など



### ◆呼吸器症状

声のかすれ、  
くしゃみ、  
のどのかゆみ、  
唇のはれ、  
息苦しさ、  
呼吸困難 など



### ◆循環器症状

頻脈、動悸、  
顔色が悪い、  
意識の消失、  
ふらつき、  
めまい など



### ◆消化器症状

腹痛、  
吐き気、  
下痢 など



- 特に、顔色が悪い、意識の消失などのショック症状や息苦しさなどは、緊急性の高い症状です。救急車を呼ぶなど直ちに対応してください。

### 【お問い合わせ先】

小野薬品工業株式会社 くすり相談室      フリーダイヤル: 0120-886-336  
受付時間: 9:00~17:00(土日・祝日・会社休日を除く)



事務連絡  
令和3年6月1日

公益社団法人日本医師会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の配布等について

医薬品の安全対策については、日頃より御尽力いただいているところであります。  
今般、別添のとおり、日本製薬団体連合会安全性委員会委員長あて通知したのでお知らせ  
します。

(別添3)

薬生安発 0601 第 1 号

令和 3 年 6 月 1 日

日本製薬団体連合会  
安全性委員会委員長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の配布等について

医薬品の使用上の注意事項については、各種情報、資料を基に評価・検討を行い、整備を図っているところです。

今般、ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム（販売名：ジョイクル関節注 30mg）について、「使用上の注意」の改訂、安全性速報及び国民（患者）向け情報の配布が必要と考えますので、速やかに必要な措置を講じるよう関係業者に対して周知徹底方お願い申し上げます。

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 52 条の 2 第 1 項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に改訂後の添付文書等記載事項の届出を行うよう、関係業者に対して併せて周知方お願い申し上げます。

なお、本件については、別途、生化学工業株式会社宛て連絡することとしていますので、念のため申し添えます。



別紙

- 【薬効分類】 399 関節機能改善剤
- 【医薬品名】 ジクロフェナクエタールヒアロロン酸ナトリウム
- 【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

【「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日付け薬生発0608第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】

現行	改訂案
<p>(新規)</p> <p>8. 重要な基本的注意 (新規) 8.1~8.3 (略)</p>	<p>下線は変更箇所</p> <p>1. <u>警告</u></p> <p>1.1 <u>本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがある</u>ので、本剤は、緊急時に十分な対応のできる準備をした上で投与し、投与後も十分な観察を行うこと。[8.1、11.1.1参照]</p> <p>8. <u>重要な基本的注意</u></p> <p>8.1 <u>本剤投与により重篤なショック、アナフィラキシーが発現することがある</u>ので、投与に際しては、緊急処置を取れる準備をすること。投与中及び投与後は患者の状態を十分に観察すること。また、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること、及びその徴候や症状について患者又は家族等に十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう、患者等を指導すること。[1、11.1.1参照]</p>

<p>11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー (0.4%)</p>	<p>8.2~8.4 (略) 11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー (0.4%) [1.、8.1参照]</p>
--	---



## Press Release

令和3年6月1日

【照会先】

医薬・生活衛生局 医薬安全対策課

課長補佐 酒井 萌 (内線 2757)

専門官 野寺 快明 (内線 2691)

(直通電話) 03(3595)2435

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者 各位

### 関節機能改善剤「ジョイクル関節注30mg」投与患者における ショック、アナフィラキシーに関する注意喚起について

本日、関節機能改善剤「ジョイクル関節注30mg」（別添1）について、ショック、アナフィラキシーが複数発現していることを踏まえ<sup>(注)</sup>、添付文書の「警告」を新設し、「重要な基本的注意」等を改訂するとともに、「安全性速報（ブルーレター）」（別添2）により、医療関係者等に対して速やかに注意喚起を行うよう、製造販売業者に指示しました（別添3）。

なお、「ジョイクル関節注30mg」は、承認申請時に提出された臨床試験成績を踏まえ、既に令和3年3月の承認当初から、添付文書において重大な副作用としてショック、アナフィラキシーに関する注意喚起がなされているほか、本剤の成分等に対して過敏症の既往歴のある患者は禁忌とされています。

(注) 本剤の承認後における副作用報告において、重篤なショック、アナフィラキシーを認めた症例が10例、うち死亡に至った症例が1例報告されました。なお、本剤との因果関係は調査中です。

#### 安全性速報の概要

##### 【今回の医療関係者に対する注意喚起のポイント】

本剤使用患者において重篤なショック、アナフィラキシーの症例が報告されていることから、次の事項に十分に注意すること。

1. 本剤の投与に際しては、緊急時に十分な対応のできる準備をした上で行うこと。
2. 本剤の投与後少なくとも30分間は、医師の管理下で患者の状態を十分に観察すること。投与直後に限らず、医療機関から帰宅後に発現している症例も報告されている点に留意すること。
3. 患者又は家族等に対して、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること、及びその徴候や症状について十分に説明し、異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう指導すること。

#### 患者・家族向けのリーフレットの概要

- 本剤投与後数時間は、アナフィラキシーが起こる可能性があること。
- 投与直後から帰宅後にかけて、状態をよく観察いただき、体調変化には十分注意すること。
- 異常が認められた場合には、すぐに医療機関を受診すること。受診の際は「ジョイクル関節注」の投与を受けたことを伝えること。
- 特に顔色が悪い、意識の消失、息苦しさなどは緊急性の高い症状であり、救急車を呼ぶなど直ちに対応すること。

## (別添 1)

## 品目情報

- 販 売 名 : ジョイクル関節注 30mg
- 一 般 名 : ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム
- 製造販売業者 : 生化学工業株式会社
- 効能・効果 : 変形性関節症 (膝関節、股関節)
- 用法・用量 : 通常、成人 1 回 1 シリンジ (ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムとして 1 回 30mg) を 4 週間ごとに関節腔内に投与する。
- 製造販売承認日 : 令和 3 年 3 月 23 日
- 販 売 開 始 日 : 令和 3 年 5 月 19 日
- 推定使用患者数 : 約 5,500 人 (承認~令和 3 年 5 月 28 日)
- 作用機序 : ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムは、滑膜細胞での高分子量ヒアルロン酸の産生促進、軟骨細胞でのマトリックスメタロプロテアーゼの産生抑制及びシクロオキシゲナーゼ阻害によるプロスタグランジン類の産生抑制を介して、変形性関節症の臨床症状を改善すると考えられる。